

Лабораторна робота № 5
ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ФУНКЦІЙ
програми **EXCEL**

Мета роботи:

- освоєння принципів роботи зі статистичними функціями програми **Microsoft Excel**;
- вивчення принципів роботи електронних таблиць **Microsoft Excel** з експериментальними даними;
- освоєння методики прийняття рішень на основі отриманих статистичних показників.
-

Короткі теоретичні відомості

Програма **Excel** має багатий набір статистичних функцій, які використовуються для швидкої і елегантною оцінки різного роду імовірнісних та статистичних параметрів. Для їх застосування треба розбиратися в математичній статистиці.

Пакет аналізу є надбудовою **Excel**. Нижче указані основні види (показники) аналізу з короткою характеристикою, підтримувані пакетом **Excel**.

- Розрахунок набору статистичних показників (мода, медіана, дисперсія і т.д.) одновимірного набору даних.
- t-тест (t-тест Стьюдента) з однаковими і різними дисперсіями для перевірки гіпотези про рівність (розходженні) середніх двох вибірок.
- Однофакторний і двофакторний дисперсійний аналіз двох або більше вибірок, що належать одній і тій же генеральній сукупності.
- F-тест для порівняння дисперсій двох генеральних сукупностей.
- Кореляція для кількісної оцінки взаємозв'язку двох наборів даних, представлених у безрозмірному вигляді.
- Коваріація для обчислення середнього твору відхилень точок даних від відносних середніх.
- Експоненційне згладжування для передбачення значення на основі прогнозу для попереднього періоду, скоригованого з урахуванням похибок у цьому прогнозі.
- Аналіз Фур'є для вирішення завдань в лінійних системах та аналізу періодичних даних з використанням методу швидкого перетворення Фур'є.
- Гістограма для обчислення вибірових та інтегральних частот попадання даних у вказані інтервали значень, при цьому генеруються числа влучень для заданого діапазону комірок.
- Ковзаюче середнє для розрахунку значень у прогнозованому періоді на основі середнього значення змінної для вказаного числа попередніх періодів.
- Генерація випадкових чисел, витягнутих з одного або декількох розподілів, для моделювання об'єктів, що мають випадкову природу.
- Регресія для аналізу впливу на окрему залежну змінну значень декількох незалежних змінних.

Усі вони мають дуже простий інтерфейс, що полегшує їх застосування. Після виклику функції необхідно вказати комірки з даними щоб отримати відповідь. В деяких випадках необхідно додатково вказати допоміжні параметри (показники), що характеризують функцію чи її представлення.

Виконання роботи

1. Ввести укомірки таблиці **Excel** два набори вихідних даних з таблиці 5.1 відповідно до варіанта завдання, зазначеному у таблиці 5.2.

Таблиця 5.1

Номер наборів вихідних даних							
№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6	№ 7	№ 8
96	276	366	322	239	216	256	229
181	265	315	177	325	153	123	506
352	419	439	309	224	312	312	271
296	378	548	138	441	283	328	362
322	353	353	282	219	185	185	130
130	315	315	289	352	419	419	285
491	456	115	273	321	418	418	325
121	366	466	257	617	296	296	61
258	314	314	124	183	332	332	95
423	279	279	267	294	317	317	257
236	388	388	256	298	281	281	160
287	398	390	184	361	372	372	269
276	393	393	187	350	241	241	281
535	172	448	170	49	501	518	271
288	340	340	63	359	286	286	329
337	383	383	176	235	311	311	266
394	256	356	481	338	406	649	319
287	392	392	231	299	535	305	99
235	529	553	361	298	290	290	198
229	339	339	284	298	216	216	189

Таблиця 5.2

варіант	Номера наборів	варіант	Номера наборів	варіант	Номера наборів	варіант	Номера наборів	варіант	Номера наборів
1	1,2	6	1,7	11	2,6	16	3,6	21	4,7
2	1,3	7	1,8	12	2,7	17	3,7	22	4,8
3	1,4	8	2,3	13	2,8	18	3,8	23	5,6
4	1,5	9	2,4	14	3,4	19	4,5	24	5,7
5	1,6	10	2,5	15	3,5	20	4,6	25	5,8

2. Використовуючи статистичні функції програми розрахувати: середнє значення, дисперсію і стандартне відхилення для кожного набору.

3. Визначити відносне відхилення мінімального і максимального значень вихідних даних в кожному наборі за формулою:

$$\beta = \frac{|X_{\min/\max} - X_{cp}|}{S}, \quad (5.1)$$

де X_{\min} / \max - мінімальне або максимальне значення в оброблюваному наборі,
 S - експериментальне значення середньоквадратичного відхилення.

4. Визначити можливість виключення розглянутого показання шляхом порівняння отриманої величини зі значеннями t -критерію одностороннього розподілу Стьюдента. Аналізований показник може бути виключений з подальшої обробки, якщо ймовірність помилкової оцінки менше 0,025. Для решти даних провести розрахунки за п. 3.

5. Використовуючи статистичні функції програми визначити медіану, асиметрію (скіс) і ексцес залишилися даних. Порівняти отримані значення з допустимими:

$$\sqrt{6 \cdot (N-1) / [(N+1) \cdot (N+3)]} - \text{для асиметрії};$$
$$\sqrt{24 \cdot N \cdot (N-2) \cdot (N-3) / [(N-1)^2 \cdot (N+3) \cdot (N+5)]} - \text{для ексцеса}.$$

Якщо вони в 2 ... 3 рази перевищують розрахункові, то припущення про нормальність розподілу необхідно піддати сумніву. Зробити на основі отриманих результатів висновки.

6. Визначити значимість відмінностей розбіжностей середніх значень двох решти наборів даних. Для чого:

- оцінити можливу дисперсію узагальненого набору даних за формулою:

$$S_{об} = \sqrt{\frac{S_1^2(N_1 - 1) + S_2^2(N_2 - 1)}{N_1 + N_2 - 2}}; \quad (5.2)$$

- розрахувати t коефіцієнт Стьюдента:

$$t = \frac{|X_{cp1} - X_{cp2}|}{S_{об} \sqrt{\frac{1}{N_1} + \frac{1}{N_2}}}, \quad (5.3)$$

- порівняти отриману величину з табличній при обраному рівні значущості і числі ступенів свободи ($N_1 + N_2 - 2$).

Якщо отримані значення перевершують табличні значення t -критерію двостороннього розподілу Стьюдента (ймовірність помилки не більше 0,025), то розбіжності середніх величин двох розподілів можна визнати значущими.

7. Порівняти дисперсії двох наборів і перевірити значимість їх розбіжностей по F -розподілу.

8. Якщо розбіжності по п. 6 і 7 виявляться незначними, то звести набори в один, визначити середнє значення, дисперсію, а також довірчий інтервал знаходження істинного значення середньої величини за формулою:

$$X_{ист} = X_{cp\ обьедин} \pm t(P, k) \cdot \frac{S_{обьедин}}{\sqrt{k}}, \quad (5.4)$$

$X_{ср\ обьед}$ – середнє значення об'єднаного набору;

k – число ступенів свободи, рівне числу величин, включених в об'єднаний набір.

Якщо набори (при зазначеному рівні ймовірності помилки) неприпустимо об'єднувати, то за формулою (5.4), обліком відповідної зміни входять до неї величин X_{cp} , $Stak$, підрахувати довірчий інтервал знаходження дійсної величини середнього значення для кожного окремого набору.

9. Розбити інтервал зміни величини X на піддіапазони. Визначити кількість даних потрапили в подіапазон і середнє значення $X_{ср}$, що характеризують подіапазон.

Побудувати графік розподілу числа вимірів в кожному піддіапазоні від середньої величини $X_{\text{ср}}$.